

Test respiratoire HELI-KIT®

Intérêt :

Ce test permet de mettre en évidence la bactérie Helicobacter pylori, responsable notamment de gastrites et d'ulcères.

Précautions particulières :

- Sujet à jeun depuis la veille au soir.
- Arrêt de tout traitement antibiotique depuis 4 semaines (AMOXICILLINE, CLAMOXYL, CLARITHROMYCINE, ZECLAR, METRONIDAZOLE, FLAGYL, LEVOFLOXACINE, TAVANIC, PYLERA...)
- Arrêt des anti-sécrétoires depuis 2 semaines (ESOMEPRAZOLE, INEXIUM, LANSOPRAZOLE, LANZOR, OGAST, OGASTORO, OMEPRAZOLE, MOPRAL, ZOLTUM, PANTOPRAZOLE, EUPANTOL, INIPOMP, RABEPRAZOLE, PARIET, ANTI H2...)
- Arrêt des anti-acides et des pansements gastro-intestinaux depuis 24 heures.

Déroulement du test :

- Apporter au laboratoire le réactif (HELI-KIT®) prescrit par le médecin et acheté en pharmacie.
- Sujet à jeun, au repos, sans boire, ni manger, ni fumer pendant l'épreuve
- Recueil de l'air expiré après ingestion de la solution test, deux fois à 30 minutes d'intervalle, en soufflant dans des tubes.
- Prévoir en tout 45 minutes.